


KLEINCELLIGE LONGKANKER

Wat is kleincellige longkanker?



Het is een agressieve, snel voortschrijdende ziekte die in de longen ontstaat, maar zich vaak naar andere organen verspreidt. De ziekte is verantwoordelijk voor ongeveer 15% van alle longkankers.

Incidentie **6/100.000** **73.5% ♂** **26.5% ♀**

Hoger bij
volwassenen
van **65 jaar** en ouder



5-jaars totaal
overlevingspercentage
7%

RISICOFACTOREN



- **Tabak:** 98% zijn huidige of voormalige rokers
- Blootstelling aan elementen zoals **radon** of **asbest**
- **Familiegeschiedenis**

STAGE



LIMITED STAGE

Het bevindt zich aan slechts één kant van de thorax. Mogelijkheid van uitzaaiing naar aangrenzende lymfeklieren.

EXTENSIVE STAGE

Het verspreidt zich over de longen, lymfeklieren en andere organen, zoals het beenmerg. Kan worden beschouwd als een uitgezaaide ziekte

SYMPTOMEN

LIMITED STAGE

- Asthenie
- Bloedspeeksel of sputum ophoesten
- Ademnood of dyspneu
- Pijn op de borst
- Onverklaarbaar gewichtsverlies
- Verlies van eetlust



EXTENSIVE STAGE

- Botpijn
- Buik- of rugpijn
- Toevallen
- Stemverlies of stemveranderingen
- Problemen met lopen

DIAGNOSE



- Onderzoek naar **de FAMILIAIRE ACHTERGROND** en **de KLINISCHE GESCHIEDENIS**.
- **BEELDVORMEND ONDERZOEK**, zoals een röntgenfoto van de borstkas, om visuele bevestiging te verkrijgen.
- **CT-scan** van de thorax, de buik en de schedel.
- **BRONCHOSCOPIE** om de luchtpijp en de bronchiën van binnenuit te onderzoeken. Hiermee kan de tumor in beeld worden gebracht en kunnen er monsters van worden genomen (BIOPSIE).
- Eventuele aanvullende onderzoeken, zoals **BOTSCAN, PET...**

INDIVIDUELE BEHANDELING



LIMITED STAGE

CHIRURGIE kan soms worden toegepast om de tumor en aangrenzende lymfeklieren te verwijderen. Mogelijke **CHEMOTHERAPIE +/- STRALINGSTHERAPIE** gevolgd door **IMMUNOTHERAPIE** (als de ziekte onder controle blijft).

EXTENSIVE STAGE

CHEMOTHERAPIE + IMMUNOTHERAPIE wordt over het algemeen gebruikt om de omvang van de tumor te verminderen. Indien de ziekte de kwaliteit van leven van de patiënt aantast, worden **ANDERE PALLIATIEVE BEHANDELINGEN** zoals laserchirurgie, pijnbestrijding of bestraling ingezet.